

एस० आर०आइ० (SRI)
विधि द्वारा
धानको खेती गरौं




विस्तार एवं प्रशिक्षण शाखा खाद्य सुरक्षा
कृषि विकास विभाग


कृषि भवन तादोड, गान्तोक

सिक्किममा लगाइने अन्न-बालीहरू मध्ये धान एक प्रमुख हो। तर उध्योगिकरण, विभिन्न प्रगतिशील कार्य प्रकृति प्रकोप अनि अन्यकारणहरूले गर्दा धान खेतीको क्षेत्रफल सिक्किम साथै भारतवर्षमानै घट्दै आइरहेछ।

धानको क्षेत्रफल घट्दा घट्दै पनि कुल उत्पादनलाई स्थिर राख्न अथवा **बृद्धि गर्नको निम्ति प्रत्येक धानको विरूवाबाट उत्पादन बढाउन सम्भव छ** जो हामी एस० आर० आई० (SRI) एक नयाँ तकनिकि विधि अजाएर गर्न सक्छौं। एस० आर०आई० विधि भनेको साधारणत धान उत्पादन बृद्धि गर्ने तरिका हो जसलाई अंग्रेजीमा System of Rice Intensification भनिन्छ।



पारम्परिक तरिका



एस० आर०आई० तरिका

एस० आर०आइ तरिकामा मुख्य चार क्षेत्रमा परिवर्तन ल्याउँछ।

- 1) धानको बिउ व्याइमा छरेर टुसा 12 दिन भित्र रोपाइ गर्न पर्छ
- 2) बेर्ना सार्दा एक-एक वटामात्रै अलग-अलग सार्नु पर्छ।
- 3) सार्दा खेरी विरूवा टाढा-टाढा लगाउन पर्छ। एक वित्ता देखि एक हात सम्म टाढा 20-30cm गरी लगाउन पर्छ।
- 4) खेतमा बडी पानी हाल्नु पर्दैन।



पारम्परिक एस० आर०आइ० तरिकाको तुलनात्मक विवरण

विवरण	पारम्परिक तरिका	एस० आर०आइ० तरिका
1) विजनको मात्रा	35-40 के० जी० प्रति हेक्टर	05 के० जी० प्रति हेक्टर
2) बिरुवाको तयारी	25-35 दिन-	8-12 दिन
3) प्रति गांजमा बेनीको संख्या	4	1
4) प्रति गांजमा हांगाको संख्या	9	55
5) प्रति हांगामा गेडाको संख्या	114	181
6) प्रति गांजमामा गेडाको संख्या	824	5858
7) पानीको आवश्यकता	अधिक पानीको आवश्यकता (अधिकांश समय 3-5 से०मा० पानी भईरहन पर्छ)	कम्ती पानीको आवश्यकता (1-3 से० मी पानीको जरूरत बालीनिस्कने समयमा)
8) उत्पादन	35 Qtl./Ha*	60 Qtl./Ha*

* (उत्पादन- उत्तरखण्डमा 2006 सालमा गरिएको फसल कटोर्दमा आधारित)

विस्तार एवं प्रशिक्षण शाखा खाद्य सुरक्षा - कृषि विकास विभाग कृषि भवन तादोड, गान्तोक